

OASI DELLA MADONNINA

SANT'ALBANO STURA (CN) - PIEMONTE

MATERIALE DIDATTICO PER IPOVEDENTI

WWW.OASIMADONNINA.EU

WWW.IATFOSSANESE.COM


WWW.UNIONEDELFOSSANESE.CN.IT


WWW.COMUNE.SANTALBANOSTURA.CN.IT

⠠⠠ ⠠⠠ ⠠⠠ ⠠⠠⠠ ⠠⠠⠠⠠ ⠠⠠⠠⠠⠠⠠ ⠠⠠⠠⠠⠠⠠ ⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠


Oasi Naturalistica La Madonnina

— — — ⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠⠠ percorso

 ⠠⠠⠠⠠⠠⠠ capanno



 ⠠⠠⠠⠠⠠⠠ altana

⠠⠠⠠⠠⠠⠠ acqua



ingresso







Alzavola, Sarcelle d'hiver, *Anas crecca*

Piccola anatra con zampe e becco scuri. Il maschio è scuro, con corpo marrone-grigio con sottili strisce bianche e nere sui fianchi, posteriore nero con macchie gialle sui lati. La testa è marrone scuro con banda verde. La femmina è in prevalenza bruna con una sfumatura di arancio nella parte inferiore.

Vola spesso in gruppo, con passaggi veloci, bassi e rapidi cambi di direzione.



Dimensioni: lunghezza 32-39 cm; apertura alare 50-64 cm.



Airone rosso, Héron pourpré, *Ardea purpurea*

Uccello di palude grande, snello e scuro con becco lungo e sottile, collo esile e sinuoso, zampe e dita lunghe. Presenta una colorazione prevalentemente marrone-rossiccia, con alcune aree grigie, bianche e nere. Il becco è arancione con macchie nerastre. Vola con le ali arcuate e con il collo piegato a formare una “S” molto più accentuata rispetto agli altri aironi.



Dimensioni: lunghezza 85-110 cm; apertura alare 120-150 cm.



Airone cenerino, Héron cendré, *Ardea cinerea*

Uccello di notevoli dimensioni, ha collo lungo, spesso incurvato e retratto, e becco affilato. Presenta una colorazione grigio chiara. Il suo volo è rettilineo e lento, con ali arcuate, capo retratto e zampe distese all'indietro. Durante la ricerca delle prede si muove lentamente o rimane immobile per lungo tempo nella stessa posizione.



Dimensioni: lunghezza 90-98 cm; apertura alare 150-160 cm.



Airone rosso, Héron pourpré, *Ardea purpurea*

Uccello di palude grande, snello e scuro con becco lungo e sottile, collo esile e sinuoso, zampe e dita lunghe. Presenta una colorazione prevalentemente marrone-rossiccia, con alcune aree grigie, bianche e nere. Il becco è arancione con macchie nerastre. Vola con le ali arcuate e con il collo piegato a formare una “S” molto più accentuata rispetto agli altri aironi.



Dimensioni: lunghezza 85-110 cm; apertura alare 120-150 cm.



Airone rosso, Héron pourpré, *Ardea purpurea*

Uccello di palude grande, snello e scuro con becco lungo e sottile, collo esile e sinuoso, zampe e dita lunghe. Presenta una colorazione prevalentemente marrone-rossiccia, con alcune aree grigie, bianche e nere. Il becco è arancione con macchie nerastre. Vola con le ali arcuate e con il collo piegato a formare una “S” molto più accentuata rispetto agli altri aironi.

Dimensioni: lunghezza 85-110 cm; apertura alare 120-150 cm.





Alzavola, Sarcelle d'hiver, *Anas crecca*

Piccola anatra con zampe e becco scuri. Il maschio è scuro, con corpo marrone-grigio con sottili strisce bianche e nere sui fianchi, posteriore nero con macchie gialle sui lati. La testa è marrone scuro con banda verde. La femmina è in prevalenza bruna con una sfumatura di arancio nella parte inferiore.

Vola spesso in gruppo, con passaggi veloci, bassi e rapidi cambi di direzione.



Dimensioni: lunghezza 32-39 cm; apertura alare 50-64 cm.



Cannareccione, Rousserolle turdoïde, *Acrocephalus arundinaceus*

Uccello con becco massiccio e appuntito, testa piatta, corpo allungato e coda lunga e leggermente arrotondata, spesso tenuta a ventaglio. Di colore rossiccio, presenta una piccola cresta durante il canto o in stato di allerta. Vola basso a coda aperta, con frequenti “tuffi” nei canneti.



Dimensioni: lunghezza 19-20 cm; apertura alare 28-30 cm.



Cavaliere d'Italia, Échasse blanche, *Himantopus himantopus*

Uccello riconoscibile per il suo piumaggio bianco e nero, con zampe molto lunghe di colore rosso-arancione. Ha testa e corpo bianchi con macchie nere variabili su nuca e ali. Il becco è sottile, dritto e di colore nero. Vola in modo rettilineo, lentamente, con le zampe stese all'indietro. Si procura il cibo nell'acqua bassa con il suo lungo becco.



Dimensioni: lunghezza 34-40 cm; apertura alare 69-78 cm.



Cormorano, Grand cormoran, *Phalacrocorax carbo*

Ha corpo allungato, collo lungo, coda lunga e a forma di cuneo.
Nuota con profilo basso e testa tenuta verso l'alto, esegue frequenti immersioni.
Il suo volo è potente e dritto, con battiti veloci e lunghe scivolate.
L'adulto ha piumaggio nerastro con riflessi verdi o blu.

Dimensioni: lunghezza 80-100 cm; apertura alare 120-150 cm.





Folaga, Foulque macroule, *Fulica atra*

Uccello acquatico grigio nero, tozzo, con dorso e coda rotondi. Spesso si immerge in cerca di cibo o pascola sul terreno; socievole. L'adulto ha becco e scudo frontale bianchi, occhi rossi, grandi zampe con dita lobate.

Volta raramente ed esegue rincorse sull'acqua per decollare.



Dimensioni: lunghezza 36-45 cm; apertura alare 68-80 cm.



Gallinella d'acqua, Poule d'eau, *Gallinula chloropus*

Uccello acquatico piuttosto massiccio di colore scuro con strisce bianche sui fianchi e sulla coda. Il becco si estende fino alla fronte in una placca, di colore rosso come la base, mentre la punta è gialla. Nuota con disinvoltura, con frequenti spinte in avanti del capo. Vola raramente, a pelo d'acqua, tenendo le zampe pendenti. Sul terreno predilige correre che volare.

Dimensioni: lunghezza 31-35 cm; apertura alare 50-58 cm.




Germano reale, Canard colvert, *Anas platyrhynchos*

Grande anatra comune con becco lungo e zampe corte e arancioni. Il maschio si presenta grigio con testa verde, collare bianco, petto marrone, posteriore bianco e nero e becco giallo-verde chiaro. La femmina è chiazzata e striata di marrone, con coda sul bianco e becco oliva o marrone.

Dimensioni: lunghezza 50-65 cm; apertura alare 81-98 cm.



Il martin pescatore è un uccello molto piccolo e veloce, con un becco lungo e sottile. È molto comune in Italia e si nutre di piccoli pesci e animali acquatici. È molto abile nel tuffarsi in acqua per catturare il suo cibo.



Martin pescatore, Martin-pêcheur d'Europe, *Alcedo atthis*

Uccello dai colori intensi, con piumaggio azzurro con riflessi metallici sulla parte superiore, arancione su ventre, addome e guance, bianco sulla gola e ai lati del collo. Vola molto rapido, a quote bassissime. Si nutre di piccoli pesci e animali acquatici catturati tuffandosi da un posatoio o in seguito a un volo stazionario detto “spirito santo”.

Dimensioni: lunghezza 16-18 cm; apertura alare 25-30 cm.




Moretta, Fuligule morillon, *Aythya fuligula*

Il maschio di questa anatra tuffatrice di piccole dimensioni è nero con fianchi bianchi, lungo ciuffo sulla nuca e occhi gialli. La femmina è bruna uniforme, con faccia e sottocoda biancastri, e ciuffo sulla nuca meno evidente. Vola in formazioni regolari ed è una buona camminatrice oltre che ottima nuotatrice e tuffatrice.

Dimensioni: lunghezza 40-47 cm; apertura alare 65-72 cm.

Il Nibbio bruno (Milan noir) è un rapace di dimensioni medio-grandi, di colore marrone scuro abbastanza uniforme e con coda lunga e forcuta. Vola con volteggi e planate ad ali piatte o arcuate verso il basso e battiti d'ala potenti e profondi. Ha una dieta molto varia, adattandosi alle possibilità del territorio che lo ospita.




Nibbio bruno, Milan noir, *Milvus migrans*

Rapace di dimensioni medio-grandi, di colore marrone scuro abbastanza uniforme e con coda lunga e forcuta. Vola con volteggi e planate ad ali piatte o arcuate verso il basso e battiti d'ala potenti e profondi. Ha una dieta molto varia, adattandosi alle possibilità del territorio che lo ospita.

Dimensioni: lunghezza 59-66 cm; apertura alare 140-150 cm.



Porciglione, Râle d'eau, *Rallus aquaticus*



Porciglione, Râle d'eau, *Rallus aquaticus*

Presenta corpo grosso e becco lungo e leggermente curvato. Ha una colorazione in prevalenza scura, marrone-grigia con screziature nere. Vola raramente, con le zampe penzolanti. Si muove con rapide corse tra la vegetazione della palude.



Dimensioni: lunghezza 26-29 cm; apertura alare 36-45 cm.



Sterna comune, Sterne pierregarin, *Sterna hirundo*

Uccello con dorso grigio chiaro, capo nero, becco a pugnale rosso con punta nera, corpo e coda forcuta bianchi. Le zampe sono corte e rosse. Molto elegante durante il volo che compie in modo ondulato seguendo i profondi battiti delle ali. Volta alto sull'acqua per poi tuffarsi per catturare le prede.



Dimensioni: lunghezza 34-39 cm; apertura alare 73-81 cm.



Svasso maggiore, Grèbe huppé, *Podiceps cristatus*

Uccello acquatico con collo stretto e lungo e caratteristica cresta tendente al nero sul capo nel periodo estivo. La parte superiore del corpo è nerastra, i fianchi sono marroni scuro screziati di fulvo; la parte anteriore del collo, il petto e il ventre sono bianchi. Vola basso e veloce, con frequenti battiti delle ali. Si tuffa sott'acqua per catturare i pesci di cui si nutre.



Dimensioni: lunghezza 50-56 cm; apertura alare 76-86 cm.



Tarabuso, Butor étoilé, *Botaurus stellaris*

Uccello di palude grande e robusto, con collo possente. Di solito sta con corpo eretto o incurvato con il collo disteso. Il piumaggio è marrone chiaro con striature nere. Vola con il collo ripiegato e con le zampe distese all'indietro. Per procurarsi il cibo si mimetizza tra le canne.



Dimensioni: lunghezza 70-80 cm; apertura alare 100-130 cm.



Tarabusino, Blongios nain, *Ixobrychus miutus*

È il più piccolo degli aironi. Il maschio è di colore fulvo acceso con dorso e punta delle ali nere con riflessi verdastri; la femmina è striata di marrone con dorso più scuro. Molto mimetico nei canneti palustri, vola rapido, a bassa quota e con le zampe distese all'indietro. È un uccello crepuscolare, molto attivo di sera e di notte.

Dimensioni: lunghezza 33-38 cm; apertura alare 51-58 cm.



Tuffetto, Grèbe castagneux, *Tachybaptus ruficollis*

È il più piccolo degli svassi, con corpo rotondo e paffuto. Scuro, ad eccezione di una macchia giallastra alla base inferiore del becco, i suoi colori variano dal nero-rosso mattone al marrone scuro a seconda della stagione. Volta raramente, a bassa quota e per brevi spostamenti. Cattura le sue prede immergendosi completamente.

Dimensioni: lunghezza 23-29 cm; apertura alare 40-45 cm.


BECCHI DI ALCUNI UCCELLI

Braille characters for bird names.


Braille characters for bird names.

Braille characters for bird names.


Braille characters for bird names.



Cannareccione



Nibbio bruno



Germano reale

Cavaliere d'Italia




Cormorano

Airone cenerino

Braille characters for bird names.


Braille characters for bird names.

Braille characters for bird names.




Braille characters for bird names.

La forma del becco varia a seconda del tipo di alimentazione dei diversi uccelli.



ESEMPIO DI HABITAT DI PALUDE



Braille characters representing the word "PENNE DELL'ALA"

PENNE DELL'ALA

Posizione delle penne

Braille characters representing "Posizione delle penne"

Braille characters representing "Scapolari Alula"

Scapolari Alula



Copritrici

Secondarie

Primarie

Braille characters representing the labels of the wing diagram


Posizione delle penne remiganti

Braille characters representing "Posizione delle penne remiganti"

Ossa dell'ala

Braille characters representing "Ossa dell'ala"


Alula








Secondarie


Primarie

Braille characters representing the labels of the wing bones diagram



FASI DEL VOLO BATTUTO








ZAMPA (A SINISTRA) E IMPRONTA (A DESTRA) DI:



Airone cenerino



Folaga

